

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ BA THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: / UBND  
V/v thông tin tình hình bệnh  
đạo ôn hại lúa Đông Xuân  
2023 - 2024

Ba Thành, ngày tháng 02 năm 2024

Kính gửi:

- Công chức ĐC-XD-NN&MT;
- Trưởng các thôn.

Theo điều tra của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Ba Tơ, hiện nay bệnh đạo ôn lá phát sinh gây hại trên lúa Đông Xuân mới phát sinh trên trà lúa làm đòng đến trở với tổng diện tích gây hại 15 ha; Trong đó nhiễm nhẹ 10 ha, nhiễm trung bình 5 ha. Với điều kiện thời tiết ẩm độ cao sương mù nhiều vào buổi sáng như hiện nay; Bệnh đạo ôn lá và bệnh đạo ôn cổ bông sẽ phát sinh gây hại trên trà lúa làm đòng đến trở đều. Nếu không tổ chức phòng trừ kịp thời và hiệu quả, bệnh có khả năng lây lan ra diện rộng làm ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng và năng suất của cây lúa.

Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bệnh đạo ôn lá, bệnh đạo ôn cổ bông gây ra đối với cây lúa và theo đề nghị của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tại Thông báo số 06/TB-TTĐVNN ngày 22/02/2024 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; UBND xã Ba Thành yêu cầu Công chức ĐC-NN, Trưởng các thôn thông báo, hướng dẫn người dân thường xuyên kiểm tra ruộng lúa tổ chức phòng trừ kịp thời theo hướng dẫn:

**1- Đối với bệnh đạo ôn lá:** Thường xuyên kiểm tra các trà lúa giai đoạn làm đòng, nếu phát hiện tỉ lệ bệnh từ 5% trở lên thì sử dụng một trong các loại thuốc có hoạt chất: Isoprothiolane, Fenoxanil+Isoprothiolane, Chitosan, Bacillus subtilis (tên thương phẩm: Fuan 40EC, Fuji-One 40EC, Ninja 35EC, Lumix 40EC, Credit 450EC, Feliso 360EC, Balus 111WP, Serenade SC, Fusai 50SL, Jolle 1SL...) để phun trừ. Sau khi phun thuốc trừ bệnh khoảng từ 5-7 ngày phải kiểm tra ruộng lúa nếu vết bệnh chưa dừng thì phải phun thêm lần thứ 2.

**2- Đối với bệnh đạo ôn cổ bông:** Những ruộng lúa đã nhiễm bệnh đạo ôn lá, những ruộng lúa bón thừa đạm, khi lúa trở cần sử dụng một trong các loại thuốc đã nêu ở bệnh đạo ôn lá để phun phòng. Nên phun làm 2 lần:

Lần 1: Sau khi lúa trở lác đác từ 1-3%.

Lần 2: Sau khi phun lần 1 từ 5- 7 ngày.

**Chú ý:**

- Khi phun thuốc trừ bệnh đạo ôn nên phun vào buổi chiều mát tuyệt đối không được phối trộn với các chất kích thích sinh trưởng hay phân bón lá. Tuân thủ đúng nồng độ và liều lượng thuốc theo hướng dẫn trên nhãn bao bì.

- Khi phun thuốc phải trang bị đầy đủ bảo hộ lao động để phòng tránh tác hại của thuốc đối với sức khỏe người sử dụng.

Yêu cầu công chức ĐC-XD-NN&MT (phụ trách Nông nghiệp - Môi trường) và các trưởng thôn tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện để phòng trừ có hiệu quả bệnh đạo ôn lá, bệnh đạo ôn cổ bông để không ảnh hưởng đến năng suất lúa về sau./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đảng ủy xã;
- HĐND xã;
- Mặt trận, các tổ chức CT-XH xã;
- Cán bộ GT-TL-KN-TY xã;
- Lưu VT.<sub>(ĐC-NN)</sub>

**CHỦ TỊCH**

**Phạm Thị Minh Đôi**