

Số: /UBND  
V/v thông tin tình hình chuột  
và sâu cuốn lá nhỏ phát sinh  
gây hại lúa Đông - Xuân  
2024 - 2025

Ba Thành, ngày tháng 02 năm 2025

Kính gửi:

- Công chức ĐC-NN-XD&MT;
- Trưởng 04 thôn.

Qua điều tra của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ba Tơ, hiện tại chuột và sâu cuốn lá nhỏ đang phát sinh gây hại lúa ở giai đoạn sinh trưởng lúa tượng khối sơ khởi đến làm đòng với diện tích nhiễm như sau:

Chuột phát sinh gây hại với tổng diện tích nhiễm 40 ha; Trong đó nhiễm nhẹ 25 ha, nhiễm trung bình 15 ha, mật độ nhiễm 4 - 7%. Phân bố trên toàn huyện.

Sâu cuốn lá nhỏ phát sinh gây hại với tổng diện tích nhiễm 40 ha; Trong đó nhiễm nhẹ 40 ha, mật độ nhiễm 11-15 con/m<sup>2</sup>. Phân bố trên toàn huyện.

Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do chuột và sâu cuốn lá nhỏ gây ra đối với cây lúa. Chủ tịch UBND xã yêu cầu Công chức ĐC-NN-XD&MT; Trưởng 04 thôn thông báo, hướng dẫn người dân thường xuyên kiểm tra ruộng lúa và phòng trừ theo hướng dẫn của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tại Thông báo số 03/TB-TTĐVNN ngày 26/02/2025, cụ thể như sau:

### 1. Đối với sâu cuốn lá nhỏ:

Sâu đang phát sinh gây hại trên trà lúa ở giai đoạn tượng khối sơ khởi đến làm đòng có khả năng sâu sẽ phát sinh gây hại nặng nên người dân thường xuyên kiểm tra lúa ở giai đoạn tượng khối sơ khởi đến làm đòng khi thấy sâu non ở mật độ từ 10 đến 20 con/m<sup>2</sup> thì sử dụng một trong các loại thuốc có hoạt chất: Emamectin 5 benzoate, Indoxacarb, Chlorantraniliprole, Lambda-cyhalothrin... (có tên thương phẩm: Actimax 50WG, Proclaim 1.9EC, Dylan 2EC, Angun 5WP, Opulent 150SC, Newamate 200SC, Ammate 30WG, Clever 150SC, Prevathon 5SC, Cyhella 250CS, Karate 2.5EC, Perdana 2.5EC...) để phun trừ.

### 2. Đối với chuột:

Đây là giai đoạn lúa chuột cắn phát mạnh nên người dân thường xuyên kiểm tra và diệt chuột bằng nhiều biện pháp, trong đó chú trọng các biện pháp bẫy cơ học, bảo vệ các loại thiên địch của chuột như rắn, rắn, chim cú... Khi cần sử dụng thuốc để diệt chuột thì nên ưu tiên các loại thuốc trừ chuột thế hệ mới có hoạt chất như Bromadiolone, Coumatetralyl, Flocoumafen... (có tên thương phẩm như Kingcat 0.05RB, Cat 0.25WP, Racumin 0.75TP, Ratmiu 0.75TP, Storm 0.005% block bait, Bromo 0.005AB...).

**Lưu ý:**

- Khi phun thuốc phải tuân thủ nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật: Đúng thuốc; đúng lúc (đúng thời điểm); đúng nồng độ, liều lượng; đúng cách (đúng kỹ thuật).

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng ghi trên nhãn bao bì đựng thuốc của nhà sản xuất trước khi sử dụng; khi phun, rải thuốc phải trang bị đầy đủ bảo hộ lao động để phòng tránh tác hại của thuốc đối với sức khỏe người sử dụng; thu gom bao bì đựng thuốc sau sử dụng bỏ vào nơi quy định; phòng chống rò rỉ thuốc ra môi trường.

Yêu cầu Công chức ĐC-XD-NN&MT, Trưởng các thôn triển khai thực hiện kịp thời để không ảnh hưởng đến năng suất lúa về sau./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Đảng ủy xã (b/c);
- CT, PCT UBND xã;
- Mặt trận, các tổ chức CT-XH xã;
- Lưu VT.(ttbd)

**CHỦ TỊCH**

**Phạm Thị Minh Đôi**